

**Publicerat för enhet:** Ortopedklinik; Operation NÄL; Operation Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvarig:** Ioannis Karikis, Överläkare, Ortopedklinik läkare (ioaka1)

**Granskad av:** Isabell Barksten Sävland, Enhetschef, Ortopedklinik läkare (isaba)

**Godkänt av:** Ove Karlsson, Verksamhetschef, Område II gemensamt (oveka1)

**Version:** 1

**Giltig från:** 2021-02-16

**Giltig till:** 2023-02-08

## Blodtomt fält (BTF) vid artroskopisk kirurgi och vissa ingrepp inom artroteamet

---

### Bakgrund

Vid artroskopiska operationer används BTF för att ha optimal vy av leden man opererar. Vissa artroskopiska operationer kan emellertid utföras utan BTF. Det är de fall där man inte förväntar sig en störande intraoperativ blödning eller kortare operationstid.

### Syfte

Skapa ett dokumentstöd gällande artroskopiska ingrepp med eller utan BTF.

### Vilka berörs

All personal på operationsavdelningar och Ortopedkliniken i NU-sjukvården.

### Ingrepp med BTF

#### *Knäled*

- artroskopiska eller öppna ligamentrekonstruktioner (främre/bakre korsband, medial [MCL]/lateral [LCL] kollateral ligament, medial patellofemoralligament [MPFL])
- patellastabiliserande ingrepp (medial plicering, lateral release, tuberositastransposition, MPFL-rekonstruktion)
- menisksuturering
- broskkirurgi
- synovektomi
- tibiaosteotomi

#### *Fotledsartroskopi*

#### *Armbågsartroskopi*

#### *Handledsartroskopi*

### Ingrepp utan BTF

#### *Knäled*

- meniskresektioner
- artroskopisk exploration
- quadriceps/patellärsena reparation/rekonstruktion (man vill inte ha muskelkontraktion på grund av BTF)
- femurosteotomi

- **Patient med kärlgraft i den aktuella extremiteten ska inte opereras i BTF!**
- **Operatören ordinerar när och hur BTF ska användas.**

- **Gällande användning av BTF hänvisar man till nedanstående PM:**

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12557/Blodtomt%20f%C3%A4lt.pdf?a=false&guest=true>