

Gipsbehandling av skador i övre och nedre extremitet

Revidering i denna version

Giltighetstiden förlängd.

Bakgrund

Oklarhet kring handläggning av patienter som behöver erhålla gips på övre och nedre extremitet på akutmottagningen har föranlett ett behov av att tydliggöra förfarandet i skrift.

Syfte

Tydliggöra handläggning av patienter som erhåller gips och dess uppföljning på akutmottagningen och inom ortopedkliniken.

Vilka berörs

Ortopedkliniken och Akutmottagningen

Åtgärd

Rutin för gipsbehandling av hand, handled och helarm

En skena eller cirkulärgips anläggs på akutmottagningen.

Som rutin planeras ett återbesök efter 7-10 dagar för röntgenkontroll. Om gipset behöver bytas eller justeras görs det på ortopedmottagningen efter röntgen.

Patienten är gipsbehandlad i totalt 3-6 veckor

Rutin för gipsbehandling av nedre extremiteter

En cirkulärgips anläggs på akutmottagningen. Som rutin planeras ett återbesök efter 12-14 dagar.

I de fall man misstänker extrem svullnad läggs en stabil dorsal gipsskena alternativt en gipsstövel som sågas upp.

Diktera i Melior och skriv på återbesökslistan på akutmottagningen att det ska vara omgipsning före röntgen så att ortopedmottagningen kan planera detta inför läkarbesöket.

Patienten gipsbehandlas i totalt 6 veckor, ibland längre tid.

