

Misstänkt och konstaterad DVT – behandling av patient

Revidering i denna version

Giltighetstiden förlängd

Bakgrund

Ortopediska patienter har, av flera anledningar, många gånger en ökad risk för DVT (djup ventrombos), Ortopedkliniken använder definitionen postoperativ komplikation om DVT uppträder inom fyra veckor postoperativt. Detta är samma definition som regionen använder i aktuellt vårdprogram.

Syfte

Tydliggörande av vårdansvaret vid misstanke om DVT.

Vilka berörs

Ortopedkliniken

Praktisk betydelse

DVT som uppträder inom fyra veckor postoperativt (28 dagar) är att betrakta som en postoperativ komplikation och ska handläggas av ortopedkliniken.

Om patienten är opererad på privat klinik ska faktura för vårdtillfället utställas till opererande klinik, enligt gällande avtal. Sekreterare Lisa Fridolfsson, ortopedkliniken behöver vid dessa tillfällen underrättas för upprättande av fakturaunderlag för ersättning från den privata vårdgivaren. Detta görs enklast vid diktering genom begäran om kopia av anteckning/epikris till Lisa Fridolfsson.

Följaktligen ska DVT som uppträder 28 dagar efter operation inte betraktas som ”postoperativ komplikation” utan därmed handläggas av annan klinik, närmast medicinkliniken alternativt öppenvården.

Lisa Fridolfsson tel 010-435 38 49

Bedömning, utredning och behandling

Västra Götalandsregionen har framarbetat ett omfattande vårdprogram för venös tromboembolism, bland annat DVT. Vårdprogrammet innehåller en detaljerad algoritm för utredning och behandling som bör följas.

För ytterligare information, vägledning inför utredning och detaljerad beskrivning av ordinationer och dosering, se regionens vårdprogram:

[Venös tromboembolism och antikoagulantibehandling](#)