

## Ordinationsmallar Melior, Ortopedkliniken

---

### Revidering i denna version

Giltighetstiden är förlängd.

### Bakgrund

Som del i klinikövergripande arbete med säker läkemedelsförskrivning ska läkare så långt möjligt använda ordinationsmallar.

### Syfte

Säker läkemedelsförskrivning

### Vilka berörs

Ortopedkliniken, Akutkliniken

### Ordinationsmallar: Akutpatienter

#### Fraktur smärtlindring (äldre)

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Oxycontin Depotablett - 5 mg (=2)

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

Panodil Filmdragen tablett - 500 mg (=6)

#### Fraktur smärtlindring (yngre)

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Oxycontin Depotablett - 5 mg (=4)

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

Alvedon - 665 mg (=6)

#### Cloxacillin Enkel antibiotika

Cloxacillin 2g x1 intravenöst (pm) 45 – 30 minuter före operationsstart

#### Cloxacillin Förlängd antibiotika

Cloxacillin 2g x3 intravenös (pm) första dos 45-30 minuter före operationsstart med andra dos 4 timmar efter första dosen. Tredje dos 12 timmar efter första dosen.

#### Dalacin Enkel antibiotika

Dalacin 600mg x 1 intravenöst (pm) 45-30m före operationsstart. Vid pc-allergi.

#### Dalacin Förlängd antibiotika

Dalacin 600mg x 2 intravenöst (pm) första dosen 45-30 minuter före operationsstart med andra dosen 4 timmar efter första dosen. Vid pc-allergi.

**Dalacin vid akut protes-op**

Dalacin 600mg x 2 intravenöst (pm) första dosen 45-30 minuter före operationsstart med andra dosen 4 timmar efter första dosen. Vid pc-allergi.

**Cloxacillin vid akut protes-op**

Cloxacillin 2g x3 intravenöst (pm) första dos 45-30 minuter före operationsstart med andra dos.

2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.

**Fragmin 4 veckor**

Fragmin injektionsvätska 5000IE (=1) – 4 veckor postoperativt

**Fragmin 10 dagar**

Fragmin injektionsvätska 5000IE (=1) – 10 dagar postoperativt

**Ordinationsmallar: Ryggkirurgi**

**Ryggkirurgi**

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Oxycontin Depotablett – 5 mg (=4)

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

Alvedon - 665 mg (=6)

Cloxacillin 2g x1 intravenöst (pm) 45 – 30 minuter före operationsstart

**Dalacin vid rygg-op. Enkel antibiotika**

Dalacin 600mg x 1 intravenöst (pm) 45-30m före operationsstart. Vid pc-allergi.

**Ordinationsmallar: elektiv proteskirurgi knä- och höft-  
protesoperation**

**Höftprotes elektiv**

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Arcoxia tablett- 60mg (=1)

Oxycontin Depotablett - 5 mg (=4)

Panodil Filmdragen tablett - 665 mg (=6)

Postafen tablett- 25mg (=2)

Fragmin injektionsvätska 5000IE (=1)

Cloxacillin 2g x3 intravenöst (pm) första dos 45-30 minuter före operationsstart med andra dos 2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

**Knäprotes med LIA**

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Arcoxia tablett- 60mg (=1)

Oxycontin Depotablett - 5 mg (=4)

Panodil Filmdragen tablett - 665 mg (=6)

Postafen tablett- 25mg (=2)

Fragmin injektionsvätska 5000IE (=1)  
Cloxacillin 2g x3 intravenöst (pm) första dos 45-30 minuter före operationsstart med andra dos.  
2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.  
Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

**Knäprotes utan LIA**

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)  
Oxycontin Depotablett - 5 mg (=4)  
Panodil Filmdragen tablett - 665 mg (=6)  
Postafen tablett- 25mg (=2)  
Fragmin injektionsvätska 5000IE (=1)  
Cloxacillin 2g x3 intravenöst (pm) första dos 45-30 minuter före operationsstart med andra dos  
2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.  
Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

**Dalacin vid elektiv protes-op**

Dalacin 600mg x 2 intravenöst (pm) första dosen 45-30 minuter före operationsstart med andra dosen 4 timmar efter första dosen. Vid pc-allergi.