

PM

Rubrik: LIA vid artroskopi knä och axel	
Enhet/förvaltning: Ortopedkliniken Blekingesjukhuset	Huvudområde/delområde: Läkemedel/Rutiner i samband med operation
Ansvarig: Tomas Ericson, verksamhetschef	Utfärdare: Cecilia Rönnfjärd, överläkare
Gemensamt med:	Version: 4.1
Godkänt datum: 2020-04-08	Nästa revidering: 2022-04-08

Alla patienter som genomgår operation med artroskopi av knäled eller axelled ska erhålla LIA-bedövning som en del av den postoperativa smärtlindringen. Målet med denna behandling är att optimera smärtlindringen samtidigt som postoperativ mobilisering underlättas.

KOPIA

Utrustning

- 1 styck 20 ml spruta.
- 2 rosa uppdragningskanyler.
- 1 styck grön intramuskulärkanyl.

Injektionslösning (blandas av operationssköterskan i en 20 ml spruta)

- 20 ml Narop 7,5 mg/ml = 150 mg.
- 1 ml Toradol 30 mg/ml = 30 mg.
- 0,2 ml Adrenalin 1 mg/ml = 0,2 mg.

Administrering

Blandningen injiceras intraartikulärt i leden antingen med hjälp av grön kanyl efter sårförslutning eller via artroskopet.

Kontraindikationer mot ingående Toradol (skall då uteslutas)

- NSAID-överkänslighet
- Svår njurinsufficiens
- Hjärtsvikt
- Graviditet