

Höft, Femoralisblockad

Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)
[Definitioner](#)
[Utredning och bedömning](#)
[Behandling](#)

[Komplikationer](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Sammanfattning

Definitioner

Nervus femoralis har sitt ursprung i L2 - L4 och lämnar bäckenet under inguinalligamentet cirka 1 cm lateralt om arteria femoralis.

Utredning och bedömning

Kontrollera att patienten har normal sensibilitet i benet före injektion och att patienten inte medicinerar med Waran. Se också till att patienten har venflon i armen och syrgas på gramma.

Behandling

Palpera ut arteria femoralis och stick cirka 1 cm lateralt om artären och cirka 1 - 2 cm djupt med 20 ml spruta och grön kanyl.

Sprid 20 ml Injektion Narop 7,5 mg/ml solfjäderformat.

Aspirera vid varje lägesförändring (vid parestesier backa någon millimeter och lägg återstående mängd här).

Anslagstiden är mindre än 15 minuter.

Maxdosen för Injektion Narop 7,5 mg/ml är 225 mg för singeldos.

Vid upprepad dosering bör man till vuxen patient inte överstiga 675 mg/24 timmar.

Detta medför att man kan lägga om femoralisblockaden efter 8 respektive 16 timmar med samma dos som vid första tillfället. Observera att Fevarin och Isoptin interagerar med Narop och för graviditet gäller B:1. För övrigt se FASS.

Komplikationer

Toxiska effekter av lokalanestetika, främst för hjärta-kärl och centrala nervsystemet, förstärks av hypoxi och acidosis och yttrar sig som parestesier kring mun och tunga liksom bradykardi och hypotension, men även synrubbningar, kramper, medvetslöshet och hjärtstillestånd.

Uppdaterat från föregående version

Ersätter 2019-03-29.

Ingen ändring.