

Tillåten belastning

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)

[Ingen belastning](#)

[Stegmarkering](#)

[Belastning till halva kroppstyngden](#)

[Belastning till smärta](#)

[Full belastning](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

I operationsberättelsen skall anges, om möjligt enligt nedanstående terminologi, vilken belastning som tillåts samt under vilken tid detta gäller.

Ingen belastning

Foten aldrig i golvet.

Stegmarkering

Normalt gångmönster med foten i golvet men utan belastning.

Gånghjälpmedel nödvändiga.

Belastning till halva kroppstyngden

Normalt gångmönster med avlastning av kroppstyngd. Gånghjälpmedel nödvändiga.

Belastning till smärta

Normalt gångmönster. Gånghjälpmedel ej nödvändiga om smärta ej finns.

Full belastning

Normalt gångmönster. Gånghjälpmedel ej nödvändiga.

Uppdaterat från föregående version

Ersätter 2014-05-15

Uppföljning och röntgen

Hitta i dokumentet

[Höftprotes](#)
[Knäprotes](#)
[Valgiserande tibiaosteotomi](#)
[Carpaltunnelklyvning](#)
[Hallus valgus](#)
[Diskbräck/Fusion](#)

[Cervikal höftfraktur](#)
[Pertrochantär höftfraktur](#)
[Fötledsfraktur](#)
[Några övriga frakturer](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

DIAGNOS	KLINISK KONTROLL	RÖNTGEN
HÖFTPROTES		Preop. och 1-3 dagar postoperativt. Protesbäcken, frontal och sida. Enligt dispensär efter 6 och 10 år.
Cementerad	Efter operatörs ordination.	
Hybrid	Efter operatörs ordination.	
Ocementerad	Efter operatörs ordination.	
Revision	Efter operatörs ordination.	
KNÄPROTES		Preop. belastad frontal och sida samt HKA. Postop. 1-3 dagar frontal och sida.
Totalplastik och delprotes	3 mån postop	
VALGISERANDE TIBIAOSTEOTOMI	Ssk. Mottagning 2 v postop. för gipskontroll. 6 v postop till doktor för mob.	Preop. HKA-bild och sida Postop. frontal och sida.
CARPALTUNNELKLYVNING	2 v postop till ssk mottagning för suturtagning eller till DSK. Till arbetsterapeut för mobilisering. (remiss kan skrivas i s m operationen).	
HALLUS VALGUS	2 v postop till ssk mottagning för suturtagning och gipsbyte. 5-6 veckor postop till operatören.	
DISKBRÄCK / FUSION	Sjukgymnast 3 v postop. Remissen skrives vid utskrivning. Operatören 4-5 veckor postop.	Vid fusion, postop. Samt vid första återbesök (ca 1 mån)

CERVIKAL HÖFT-FRAKTUR	3 mån postop inkl röntgen om operatör önskar så.	Postop 1-3 dagar frontal och sida
PERTROCHANTÄR HÖFTFRAKTUR	3 mån postop utföres av husläkaren. Efter 1 v front och sida.	Postop 1-3 dagar.
FOTLEDSFRAKTUR	2-3 v postop till ssk mottagning för suturtagning och gipsbyte. 6 v postop till ssk mottagning för gipsborttagning och till sjukgymnast för mob. (remiss kan skrivas vid utskrivning)	Postop frontal och sida.
NÅGRA ÖVRIGA FRAKTURER		
Radius	Reponerade: 1 v - 10 dag postop 4 v postop till arbetsterapeut för mob (remissen kan skrivas på 1 v:s kontrollen), Odislocerade: Väsentlig odisloc greenstick kan mob på husläkarmott	1 v - 10 dag postop
Collum chirurgicum	1 -2v efter traumat till doktor	1 vecka
Humerusdiafys	1 v efter traumat till doktor	1 vecka
Tuberculum majus	1 v efter traumat till doktor	1 vecka
Metacarpal- och fingerfrakturer som reponeras	1 v efter traumat till doktor. 3 v efter traumat till arbetsterapeut för mob.	1 vecka

Uppdaterat från föregående version

Utgåva 5. Ersätter 2012-05-21