

Antibiotikarutiner gällande artroplastikpatienter

Med anledning av tidiga infektioner och urval av bakterier ändrar vi perioperativ antibiotikarutin till regim liknande med övriga Sverige.

Ändringen blir 3-dosförfarande över dygnet med Kloxacillin;

2 gram 45-30 minuter före operationsstart/anläggande av blodtomt fält ska infusionen påbörjas. Infusionstid ca 20 – 30 min. Denna tid dokumenteras i Cosmic.

2 gram 2 timmar efter första dosen

2 gram 6 timmar efter första dos

Rekommendation vid penicillinallergi

Tag noggrann allergianamnes. Vid tveksamhet angående allergianamnes kontakta allergolog.

1. Har patienten enbart haft utslag som varit begränsade och utan påtaglig klåda?
Ge Kloxacillin som ovan 2 g vid 3 tillfällen (0, 2, 6 timmar)
2. Har patienten haft utbredda kliande utslag och/eller angioödem?
Ge Cefotaxim 2 g vid 2 tillfällen (0 och 4 timmar)
3. Har patienten haft anafylaxi med luftvägssymptom och/eller blodtrycksfall , svimning?
Ge Klindamycin 600 mg vid 2 tillfällen (0 och 4 timmar)

(<https://lof.se/wp-content/uploads/Profylaktiskt-antibiotikum.pdf>)