

Checklista för behandling med Prolia

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Daniel Albertsson, distriktsläkare vårdcentralen Moheda
Snjezana Barbir, överläkare akutgeriatriska kliniken Växjö
Michael Anderzon, överläkare medicinkliniken Växjö

Personnummer _____

Namn _____

Övrigt _____

Orinationsdatum _____ **Läkare** _____

- | | | |
|---|----|-----|
| ☐ Pågår eller planeras invasiv tandvård? | Ja | Nej |
| ☐ Allergier? | Ja | Nej |
| ☐ Kalk- och D-vitaminbehandling | | |
| ☐ Provtagning 1–2 veckor före varje planerad behandling (S-kalciumjon och P-kreatinin).
Räkna vid behov ut absolut GFR.
Risken för hypokalcemi är högre vid GFR <30 ml/min. | | |
| ☐ Normalt värde S-kalciumjon | | |
| ☐ Provtagning även 2 veckor efter första behandling (S-kalciumjon och P-kreatinin) för att utesluta hypokalcemi. Om GFR > 30 ml/min behövs ej uppföljande prov tas efter följande injektioner. | | |

- ☐ Kallelse och [patientinformation](#) skickad till patienten
- ☐ Prolia injektionsvätska 60 mg rekvireras i beställningsmall för läkemedel
- ☐ Behandlingsdatum _____
- ☐ Patienten är utrustad med telefonnummer till sjuksköterska/mottagning
- ☐ Nästa behandling _____

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare