

## Handkirurgi

Charlotte Jeppsson  
Sektionschef  
[Charlotte.CJ.Jeppsson@skane.se](mailto:Charlotte.CJ.Jeppsson@skane.se)

### BEHANDLINGSSTÖD

Datum 2016-09-30  
Giltig till 2021-09-30

## Infektioner - Indikationer för remiss till Handkirurgi och förslag på undersökningsmetoder

För att underlätta för dig vid inremittering finns här information om:

- Symptom
- Utredning i primärvården
- Behandling i primärvården
- Indikationer för remiss till Handkirurgi
- Efterbehandling

### Symtom

Generellt: Svullnad, rodnad, värmeökning, smärta/värk, nedsatt funktion.

Artrit: leden hålles stilla. Rörelsesmärta, både passivt och aktivt.

Palpationsömhet och uttalad ruckömhet över leden.

Tendovaginit: Fingret hålles semiflekterat – Primärt ömhet längs senskidans utbredning, senare blir passiv extension smärtsam.

Abscess: En speciell form är pulpaabscessen som är kraftigt ömmande och spänd.

### Utredning i primärvården:

Kontrollera temp, CRP, leukocyter, markera rodnat område för att bedöma progress/ regress. Om recidiverande infektioner utred bakomliggande orsak: Röntgen för att utesluta osteit, ultraljud vid misstanke om främmande kropp.

Tänk på att alltid odla innan antibiotika sätts in!

### Behandling i primärvården:

Infektion utan allmänpåverkan och utan misstanke artrit/ tendovaginit:  
Punktera/incidera ytliga abscesser. Immobilisera i högläge

Kontrollera inom 1-2 dygn att infektionen inte progredierar.  
Antibiotikaförslag enligt nedan i 7-10 dagar.

Kontaminerad sårskada/klinisk infektion	T. Heracillin 1g x3 (Dalacin 300mg x3 om allergi)
Skada i lantbruk eller vid utomhusarbete	T. Eusaprim Forte 1x2
Sårskada efter människobett	T. Kåvepenin 1g x3 (Dalacin 300mgx3 om allergi)
Sårskada efter djurbett	inom 3 d – T. Amimox 0.5g x 3. Om >3 dagar efter bett: T. Spektramox 0.5g x 3. (K. Dalacin 300mg x 3 om allergi)

### Indikationer för remiss:

Symtom som progredierar trots 2-3 dagars antibiotikabehandling.

Misstanke om bakteriell tendovaginit eller artrit.

Vid feber eller lymfangit eller allmänpåverkan.

**Vid frågor eller akuta remisser kontakta alltid handkirurgkonsulten via sjukhusväxeln.**