

PO Gastro Hud Reuma  
Reuma

Utsättning av DMARD-preparat i samband med elektiva operationer: Rekommendationer.

## **Konventionella och riktade syntetiska DMARDs (csDMARD tsDMARD)**

### **PATIENTEN KAN FORTSÄTTA MED MEDICINEN, DOCK UPPEHÅLL OPERATIONS DAGEN**

- Klorokinfosfat ®
- Hydroxyklorokin, Plaquenil ®
- Salazopyrin EN ®
- Sandimmun Neoral ®
- Leflunomid, Arava ®
- Methotrexate, Metoject ®, Injexate ®
- Azathioprin, Imurel ®
- Mykofenolatmofetil, Cellcept ®
- Apremilast, Otezla ®

### **PATIENTEN GÖR UPPEHÅLL ETT DYGN FÖRE SAMT ETT DYGN EFTER OPERATION**

*Vid postoperativa komplikationer  
rekommenderas förlängt uppehåll*

### **PATIENTEN GÖR UPPEHÅLL 7 DYGN FÖRE SAMT 1-2 VECKOR EFTER INGREPP/VID SÅRLÄKNING**

- Cyklofosamid, Sendoxan ® (Om i v cyklofosamid: spec situation, individuell bedömning elektiv kirurgi undviks lämpligen)
- Baricitinib, Olumiant ®
- Tofacitinib, Xeljanz ®
- Upadacitinib, Rinvoq ®
- Filgotinib, Jyseleca ®

PO Gastro Hud Reuma  
Reuma

## **Biologiska DMARD (bDMARD)**

**Infliximab (Remicade ®, Inflectra ®, Flixabi ®) :** Uppehåll 8 veckor före operation

**Adalimumab (Humira ®, Hyrimoz ®, Imraldi ®) :** Uppehåll 2 veckor före operation

**Etanercept (Enbrel ®, Benepali ®) :** Uppehåll en vecka före operation

**Certolizumab (Cimzia ®) :** Uppehåll 2 veckor före operation

**Golimumab (Simponi ®):** Uppehåll 4 veckor före operation

**Anakinra (Kineret ®):** Uppehåll en vecka före operation

**Rituximab (Mabthera ®, Rixathon ®, Truxima ®):**

Så långt från infusion som är rimligt, riktmärke >4 mån

**Abatacept, (Orencia ®) I V:** Uppehåll 4 veckor före operation

**S C:** Uppehåll en vecka före operation

**Tocilizumab (RoActemra ®) IV:** Uppehåll 4 veckor före operation

**SC:** Uppehåll en vecka före operation

**Sarilumab (Kevzara ®) :** Uppehåll 2 veckor före operation

**Belumimab (Benlysta ®) :** Uppehåll 4 veckor före operation

**Guselkumab (Tremfya ®) :** Uppehåll 4 eller 8 veckor före operation (beroende på doseringsintervall)

**Sekukinumab (Cosentyx ®) :** Uppehåll 4 veckor före operation

**Ixekizumab (Taltz ®) :** Uppehåll 4 veckor före operation

**Ustekinumab (Stellara ®) :** Uppehåll 12 veckor före operation

**ÅTERINSÄTTNING.** En till 2 veckor efter ingrepp/vid sårsläkning