

Dokumenttitel: OP;KNÄ:Infiltrationsanestesi vid knäplastik-kirurgi	Diarienummer: LS-OREK16-0124-1
Ämnesområde: Läkemedel	Giltig från: 2008-09-23
Nivå: Instruktion	
Författare:	
Dokumentansvarig: Ortopedkliniken Mälarsjukhuset-Kullbergsska sjukhuset	
Beslutad av: På huvuddokument anges namn på instans, datum och paragraf, t.ex. Landstingsfullmäktige den 2 april, § 23/15. På anvisningar och instruktioner anges den tjänsteman samt titel som beslutat, t.ex. Anders Svensson, verksamhetschef	

OP;KNÄ:Infiltrationsanestesi vid knäplastik-kirurgi

Infiltrationsanestesi vid knäplastik-kirurgi

Rutinmässigt opereras knäplastiker i spinalanestesi (SPA), eller om kontraindikationer/speciella skäl föreligger, i narkos.

Ansvarig anestesilog ordinerar enligt mall.

Dessa patienter skall inte ha en NSAID som premedicinering.

Operationssköterskan drar under sterila betingelser upp läkemedel enligt följande:

Narop 2mg/ml, kassera 50 ml av de 200 i förpackningen (återstår 150 ml).

- Tillsätt Adrenalin 0,1 mg/ml 5ml
- Tillsätt Toradol 30 mg/ml 1ml
- Fördela dessa 156 ml i tre 50 ml-sprutor

Innan cementering infiltrerar operatören bakre kapseln med innehållet i spruta I. Protesdelarna cementeras, varefter innehållet i spruta II infiltreras i kapseln och suprapatellärt.

Spruta III gives strax innan man syr ihop huden, infiltreras i subcutis och utanför kapseln, efter att man har släppt blodtomhet och blodstillat. Ingen postoperativ kateter ska lämnas från operationssåret.

Postoperativt ges analgetika vid behov enligt Klinikens rutiner.