



Höftledsplastik, primär indikation för operation

Daglig vilovärk och/eller belastningssmärta i lumske och/eller lår, knä som inte svarat på konservativ behandling.

Nedsatt rörelseomfång.

Nedsatt gångförmåga och/eller nedsättning av annan för patienten väsentlig funktion p.g.a. smärta.

Upphävd ledspalt i hela eller delar av leden vid konventionell röntgen.

Indikation föreligger inte vid:

Rörelseinskränkning utan smärta.

Uttalade röntgenologiska artros/atritförändringar utan signifikanta symtom.

Enbart benlängdsskillnad.

Absolut kontraindikation:

Nyligt genomgången bakteriell infektion i leden.

Neuropatisk ledsjukdom.

Arteriell insufficiens i aktuellt ben.

Hög komplikationsrisk föreligger vid (erfaren höftplastikkirurg ska rådfrågas):

Multisjuk individ

Rökare, KOL

BMI >35

Stor benförlust (benattrition)

Gammal utläkt infektion i eller kring leden

Tidigare större operationer/ärr i och kring höftleden

Osteoporos/osteonekros

Neurologisk sjukdom inkl. demens

Missbruk

Risk för tidig proteslossning:

Unga aktiva individer

Tungt kroppsarbete