

Generella direktiv (läkemedel) VO Ortopedi och handkirurgi – avdelning 70A och 70B

Enhet: Vårdavdelning 70A och 70B

Indikation	Läkemedel	Dosering	Administrat ionssätt	Notera vid administrering	Övriga instruktioner	Kontraindikation(er)
Andningsbesvär	Ipramol Lösning för nebulisator, 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml	2,5 ml vid behov, högst 7,5 ml per dygn i 3 dygn	Inhalation Nebulisator	Administreras via nebulisator	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	Leversvikt Njursvikt
	Medicinsk Oxygen AGA Medicinsk gas, komprimerad, 100 %	1-2 Liter/minut vid behov, högst 2Liter/minut per utdelning i 3 dygn	inhalation			
Blodtrycksfall	Ringer-Acetat Brauma Infusionsvätska, lösning	1000 ml engångsdos	Intravenös infart		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Diarré	Loperamid Mylan Kapsel, hård, 2 mg	1-2 kapsel vid behov, högst 8	oralt	Börja med 2 tabletter, därefter kan 1	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	Leversvikt

Indikation	Läkemedel	Dosering	Administrationsätt	Notera vid administrering	Övriga instruktioner	Kontraindikation(er)
		kapslar per dygn i 3 dygn		tablett ges efter varje avföringstillfälle. Minst 2 timmar mellan första två doserna.		
Epileptiska kramper	Stesolid Rektallösning, 5 mg	1-2 endos behållare vid behov, högst 2 endosbehållare per dygn i 1 dygn	rektalt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	Leversvikt
Feber	Paracetamol Evolan Suppositorium, 1 g	1 suppositorium vid behov, höst 4 suppositorier per dygn i 3 dygn	rektalt		Se FASS.se för aktuell information - www.fass.se	
	Alvedon Brustablett, 500mg	1-2 Brustabletter vid behov, högst 8 Brustabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Alvedon Filmdragerad tablett, 500mg	1-2 tablett vid behov, högst 8 tabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Förhöjd blodsockerhalt	NovoRapid Innolet Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna, 100 E/ml	4-8 E vid behov, i 3 dygn	subkutan inj	Snabbverkande insulinanalog	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Förstopning	Cilaxoral Orala droppar, lösning, 7,5 mg/ml	5-20 droppar vid behov, högst 20 droppar per dygn i 3 dygn	oralt	Ges till kvällen	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	

Indikation	Läkemedel	Dosering	Administrationsätt	Notera vid administrering	Övriga instruktioner	Kontraindikation(er)
	Movicol Pulver till oral lösning i dospåse	1 dospåse vid behov, högst 3 dospåsar per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Microlax Rektallösning	1 endosbehållare vid behov, högst 2 endosbehållare per dygn i 3 dygn	rektalt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Dulcolax Suppositorium, 10 mg	1 suppositorium vid behov, högst 1 suppositorier per dygn i 3 dygn	rektalt	Förs in i ändtarmen med den spetsiga änden först.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Gasbildning	Minifom Kapsel, mjuk, 200 mg	1 kapsel vid behov, högst 4 kapslar per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Halsbränna	Gaviscon Oral suspension,	10-20 ml vid behov, högst 40 ml per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	- Gravyt nedsatt njurfunktion
	Novalucol Tuggtablett,	1-2 tuggtablett vid behov, högst 8 tuggtabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Omeprazol Actavis Enterokapsel ,hård, 20 mg	1 kapsel vid behov, högst 1 kapslar per dygn i 3 dygn	oralt	Sväljes hela, Får inte krossas eller tuggas. Kapseln kan lösas i vatten vid sväljsvårigheter	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	

Indikation	Läkemedel	Dosering	Administrationsätt	Notera vid administrering	Övriga instruktioner	Kontraindikation(er)
Hosta (med segt slem)	Acetylcystein Meda Brustablett, 200 mg	1 brystablett vid behov, högst 3 brystabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Mollipect Oral lösning, 0,5 mg/ml + 1 mg/ml	15 ml vid behov, högst 45 ml per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Hosta (rethosta)	Cocillana-Etyfin Oral lösning	5-10 ml vid behov, högst 30 ml per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Illamående	Primperan Injektionsvätska, lösning, 5 mg/ml	1-2 ml vid behov, högst 6 ml per dygn i 3 dygn	Intravenös inj		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Ondansetron B. Braun Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml	2 ml vid behov högst 2 ml per dygn i 3 dygn	Intravenös inj		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Postafen tablett, 25mg	1 tablett vid behov, högst 2 tabletter per dygn i 3 dygn.	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Primperan Tablett, 10 mg	1-2 tablett vid behov, högst 3 tabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Ondansetron Bluefish Filmdrage rad tablett. 4mg	1 tablett vid behov, högst 3 tabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Inför åtgärd / undersökning	Ibuprofen ratiopharm Filmdrage rad tablett, 400 mg	1-2 tabletter vid behov, högst 2 tabletter per	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	Leversvikt Njursvikt

Indikation	Läkemedel	Dosering	Administrationsätt	Notera vid administrering	Övriga instruktioner	Kontraindikation(er)
		utdelning i 1 dygn				
	Glucos Baxter 50 mg/ml buffrad Infusionsvätska, lösning,	1000 ml vid behov, i 1 dygn	Intravenös inf	Preoperativt. Ges på 12 timmar vid fasta.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	Njursvikt
	Panodil Filmdragerad tablett, 500 mg	2-4 tabletter vid behov, högst 4 tabletter per utdelning i 1 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Kateterlås	Actilyse Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning, Spädd till 1 mg/ml <i>Spädning/blandning:</i> Spädninginstruktion för 2,2 mg Actilyse 2 mg till slutlig koncentration 1 mg/ml. Späd med 2,2 ml Sterilt vatten Braun Spädningsvätska för parenteral användning. 2,2 ml sterilt vatten tillsätts till injektionsflaskan med Actilyse pulver. Slutligen koncentration; 1 mg/ml. Injektionsflaskan på 2 mg (innehåller totalt 2,2mg alteplas, överskottet på 0,2 mg blir kvar i sprutan så att den administrerade dosen är 2 mg altepas) skall alltid rekonstitueras till en slutlig koncentration på 1 mg altepas per ml. (FASS 2017-07)	2,2 ml vid behov i 3 dygn	Intravenös inj	1 ampull 2,2 ml injiceras i SVP/CVK eller 0,5 - 1,0ml i piccline. Låt verka i 30min. Aspirera.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Klåda	Loratadin Actavis Tablett, 10 mg	1 tablett vid behov, högst 1	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	

Indikation	Läkemedel	Dosering	Administrationsätt	Notera vid administrering	Övriga instruktioner	Kontraindikation(er)
		tablett per dygn i 3 dygn				
	Hydrokortison Trimb Kräm, 10 mg/g	1 applicering vid behov i 3 dygn	utvärtes	Appliceras tunt vid icke-vätskande, icke-infekterade utslag. Salvan appliceras morgon och kväll	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Kärlkramp	Nitrolingual Sublingualspray, 0,4 mg/dos	1-2 dos vid behov, högst 3 doser per dygn i 3 dygn	sublingual		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Lokal smärta vid behandling	EMLA* Kräm, 25mg/g + 25mg/g	2g vid behov, i 1 dygn	utvärtes	1g = 3,5cm krämsträng	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Instillagel Gel, 20,9 mg	5-20 ml engångsdos	uretral	KAD-bedövning	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	EMLA* Medicinskt plåster, 25 mg/25 mg	1 plåster vid behov i 1 dygn	utvärtes	Appliceras på huden 1 timme före ingrepp. Får appliceras högst 5 timmar.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Låg blodsockerhalt	Glukos Fresenius Kabi Injektionsvätska, lösning, 300mg/ml	10-40 ml vid behov, i 1 dygn	Intravenös inj.		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Nikotin-abstinens	Nicotinell Depotplåster, 14 mg/24 timmar	1 plåster vid behov, högst 1 plåster per dygn i 3 dygn	transdermal	t	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Nicotinell Depotplåster, 21 mg/24 timmar	1 plåster vid behov, högst 1	Transdermalt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	

Indikation	Läkemedel	Dosering	Administrationsätt	Notera vid administrering	Övriga instruktioner	Kontraindikation(er)
		plåster per dygn i 3 dygn				
Oro eller ångest	Sobril Tablett, 5 mg	1 tablett vid behov, högst 3 tabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Smärta	Citodon Tablett, 500 mg/30 mg	1-2 tablett vid behov, högst 8 tabl per dygn i 3 dygn	oralt	Till handkirurgiska patienter > 15 år.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Tradolan Filmdragerad tablett, 50 mg	1-2 tablett vid behov, högst 8 tabl per dygn i 3 dygn	oralt	Till handkirurgiska patienter > 15 år.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	Leversvikt Njursvikt
	Naproxen Orifarm Tablett, 500 mg	0,5-1 tablett vid behov, högst 2 tabletter per dygn i 3 dygn	oralt	Till handkirurgiska patienter > 15 år.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	Leversvikt Njursvikt
	Alvedon Filmdragerad tablett, 500 mg	1-2 tablett vid behov, högst 8 tabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Oxynorm kapsel, 5mg	1 tablett vid behov, högst 2 per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	OxyNorm Injektionsvätska, lösning, Spädd till 1 mg/ml Spädning Instruktion för OxyNorm 10 mg/ml till slutlig koncentration 1 mg/ml Späd med 9 ml Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml Spädningsvätska för parenteral användning	1-2 ml vid behov högst 6 ml per dygn i 3 dygn	intravenös inj		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	

Indikation	Läkemedel	Dosering	Administrationsätt	Notera vid administrering	Övriga instruktioner	Kontraindikation(er)
	1 ml OxyNorm (10 mg/ml) spädes med 9 ml Natriumklorid (9 mg/ml). Slutkoncentration: 1 mg/ml					
	Alvedon Brustablett, 500 mg	1-2 brustablett vid behov, högst 8 brustabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Paracetamol Evolan Suppositorium, 1 g	1 suppositorium vid behov, högst 4 suppositorier per dygn i 3 dygn	Rektalt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Morfin Meda Injektionsvätska, lösning, Spädd till 1 mg/ml <i>Spädning/blandning</i> Spädning instruktion för Morfin Meda 10 mg/ml till slutlig koncentration 1 mg/ml Späd med 9 ml Natriumklorid Braun 9 mg/ml Spädningsvätska för parenteral användning 1 ml Morfin (10 mg/ml). Slutkoncentration 1mg/ml	1-2 ml vid behov högst 6 ml per dygn i 3 dygn	intravenös inj		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Ibuprofen ratiopharm Filmdragerad tablett, 400 mg	1 tablett vid behov, högst 3 tabletter per dygn i 3 dygn	oralt	Till handkirurgiska patienter > 15 år.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	Leversvikt Njursvikt
	Morfin Meda Tablett, 10 mg	0,5-1 tablett vid behov, högst 2 tabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	

Indikation	Läkemedel	Dosering	Administrationsätt	Notera vid administrering	Övriga instruktioner	Kontraindikation(er)
Sömnstörning	Propavan Tablett, 25 mg	1 - 2 tablett vid behov tillnatten högst 2tabletter per dygn i 3 dygn	oralt		Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
	Zopiclone Actavis Filmdragerad tablett, 5 mg	1 tablett vid behov tillnatten högst 1tablett per dygn i 3 dygn	oralt	Tas omedelbart före sänggåendet.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	Leversvikt Njursvikt
	Imovane Tablett, 7,5 mg	1 tablett vid behov tillnatten högst 1tablett per dygn i 3 dygn	oralt	Tas omedelbart före sänggåendet.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	Leversvikt Njursvikt
Tromboflebit	Hirudoid Kräm	1 insmörjning vid behov, i 3 dygn	utvärtes	Masseras in och bör inte användas på öppna sår, skadad hud eller i ögon.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	
Åtgärd/undersökning	Natriumklorid Fresenius Kabi Infusionsvätska, lösning, 9 mg/ml	500 ml vid behov i 3 dygn.	intravenös inf	Bärdropp till läkemedel.	Se FASS.se för aktuell information www.fass.se	