

Korsbandsrekonstruktion, pre-, peri-, postoperativt LE

Kirurgi

Artroskopisk rekonstruktion av korsband. Nytt korsband byggs upp av knäskålssenan.

Anestesiform

Larynxmask. Generell anestesi med TCI eller Sevofluran/Fentanyl. Spinal när något talar emot narkos.

Operationstid

60 – 75 minuter

Antibiotikaprofylax

Se länk: [Antibiotika - användning av - LE](#)

Operationsläge

- Rygläge med lårstöd. Fotkudde.
- Eventuellt blodtomt.

Operationssalsdisciplin

Stängd sal. Hjälmskydd. Operationssköterska, operatör och eventuell assistent byter operationskläder mellan patienterna. Engångskläder pga infektionskänslig kirurgi.

Förband

Iceband förband läggs på knäet efter operation av operatör.

Smärtlindring

- Betapred 8 mg innan induktion.
- Operatören lägger lokalbedövning vid operationsstart.
- Vid operationsslut läggs Narop 7,5 mg/ml, eller 5 mg/ml + ev Morfin 10mg/ml, 0,2 ml.
- I övrigt ge smärtlindring som vid generell anestesi.

Postoperativt

- Byte av Iceband när det börjar tina, och före hemgång.
- Puls, blodtryck, saturation, AF var 15:e min 1 timme, därefter glesare.
- [Kateterisering och övervakning av urinblåsan vuxna – lokal rutin LE](#)
- Kontroll av förbandet.
- Operatören ska fylla i [Ortopedi - utskrivningsmeddelande efter artroskopi - Lasarettet i Enköping](#)
Samt träningsprogram som finns i pärm (dikteringsrum 6 – 7)
- Fika innan hemgång.