

LIA - Ropivacain vid höft- och knäledsplastik LE

Knäledsplastik

Standard är att patienter som ska genomgå en knäledsplastik får Addukturblockad av anestesilog preoperativt [Addukturblockad standard - operationsavdelningen LE](#).

Adduktorblockaden innehåller Ropivacain 7,5mg/ml, 20ml.

Infiltration knä

LIA med Ropivacain 2mg/ml ges av operatör perioperativt. Maxdos är **100ml** då patienten har fått adduktorblockad.

Ropivacainet injiceras i tre omgångar av operatören.

1. Bakre kapseln och ev. intercondylärt.
2. Efter cementering, kapsel och koll.ligament (glöm ej muskelvinkeln).
3. Efter kapselslutning, subcutis.

Höftledsplastik

Som standard ges ingen infiltration vid höftledsplastik. Vid generell anestesi bör operatör och ansvarig anestesilog diskutera behov av LIA. Vid smärtproblematik postoperativt kan anestesilog överväga Femoralisblockad.

Infiltration höft

LIA med Ropivacain 2mg/ml ges av operatör perioperativt. Maxdos **200ml**.

Dokumentation

LIA Ropivacain som ges perioperativt dokumenteras av anestesisköterska.

Dokumenthistorik

Piotr Binieda Anestesilog. Johanna Ejnarsson Anestesisjuksköterska. Jazmina Mehaj Anestesisjuksköterska.

Reviderad 2021-02-08 avseende dos av Piotr Binieda anestesilog.