

## Ledpunktion och provtagning - Ortopedi

- Ledpunktionen ordinerar och utförs av läkare.
- Dokumentera uppgifter om punktionen inklusive märkning och identitetskontroll.

### Detta behövs:

Steril skål, engång	Injektion Xylocain 10 mg/ml
Sterila torkar	Kanyl svart injektion
Klorhexidinsprit 5%	Kanyl rosa för punktion
Spruta 20 ml	Hålduk, operationsduk
Spruta 5 ml	Kanyl rosa för överföring av prov till provtagningsrör

### Tillvägagångsätt:

Informera patienten om vad som ska ske  
 Tvätta dina händer  
 Duka upp sterilt  
 Tvätta noga och stort runt punktionsstället  
 Tvätta från knäets mitt och ut mot sidorna och undersida ben  
 Klä in leden med steril hålduk, lägg operationsduk under benet  
 Förband enligt ansvarig läkare när punktionen är utförd

Provtagningsrör	Analyser	Anmärkning	Mängd
Lila rör	Celler	Inte med rörpost. Blandas direkt efter provtagning	2 ml eller mer
Mörkblå propp	Glukos i ledvätska		0,5 ml eller mer
Rosa/grå rör	P-glukos eller kapillärt		
Mörkblå propp Förvaras i kylskåp	Laktat i ledvätska	Omedelbart på is till KKF lab. Inte med rörpost	5 ml
Plaströr sterilt	Direktmikroskopi	Vardagar 8-17.15 Baktlabremiss Kryssa ledpunktat och allmän bakterie	2 ml eller mer
Plaströr sterilt	Odling	<u>Baktlab-remiss</u> 1. Kryssa ledpunktat 2. Kryssa ledpunktat och allmän odling och ev resistensbestämning	1-10 ml
Mörkblå propp	Kristaller i ledvätska		7 ml

Provtagning med 16-SRNA ska utföras i de fall patienten redan står på antibiotika.