

# Omläggning av operationssår verksamhetsområde ortopedi

Inspektion av operationsförbandet görs av ansvarig sjuksköterska var gång hon/han påbörjar sitt arbetspass och därefter vid behov. Torra, oretade och icke läckande bandage ska lämnas orörda. Omläggning av operationssåret sker enligt följande:

|   |
|---|
| <b>Läckage av operationsförband på natten operationsdagen:</b><br>Förstärkning av operationsförbandet med ABS-förband.  |
| <b>Mättat, stelt förband som förhindrar mobilisering</b><br>Omläggning enligt steril rutin  |
| <b>Läckande förband</b><br>Omläggning av operationssåret görs enligt steril rutin   |
| <b>Misstänkt infektion</b><br>Omläggning sker i samband med att läkaren tittar på såret. Steril rutin används och sårodling tas i samband med detta efter läkarordination |

## Omläggningsmetoder

### Omläggning enligt ren rutin

Information finns i vårdhandboken.

### Omläggning enligt steril rutin

I samband med steril omläggning bör två personal medverka, en person (personal 1) som gör själva omläggningen och den andra (personal 2) som assisterar. I samband med operation ska basala hygienregler och klädregler följas. Under omläggningen använda sterila instrument, sterila handskar, sterilt förband och sterila lösningar.

## Utanför patientsalen:

Desinficera omläggingsvagnen, vid behov rengör den innan.

Plocka fram och lägg upp materialet som skall användas på vagnen. OBS: Öppna inte förpackningarna ännu. Tvätta och desinficera händer och sprita händer och ta på plastförkläde

## Inne på salen:

Ta med omläggingsvagnen in till patienten och informera patienten om vad som ska ske.

Personal 1 och 2 har nu desinficerat sina underarmar och händer och bär förkläde.

Personal 1 tar på plasthandskar och tar bort de gamla förbandet och kasserar detta samt de använda handskarna och desinficeras händer och underarmar

Undertiden sterildukar personal 2 upp för omläggningen på omläggingsvagnen. Personal 1 tar sterila handskar och rengöra såret med sterilt koksalt och sterila kompresser Byt handskar. Torka försiktigt den omgivande huden torr med sterila kompresser och applicera det nya sterila förbandet.