

Radiusfraktur, pre-, peri- och postoperativt LE

Kirurgi

Extern fixation av radiusfraktur med platta och skruvar, orsakat av trauma.

Anestesiform

- Generell anestesi med larynxmask. TCI eller Sevofluran/Fentanyl.
- Värmetäcke och varm Ringeracetat.

Operationstid

40 - 60 min.

Operationsinstrument

Plocklista och operationsmall finns.

Antibiotikaprofylax

[Antibiotika - användning av - LE](#)

Operationsläge

Ryggläge med handarmbord.

Salsdisciplin

Låst sal med hjälm och munskydd för samtliga, implantat.

Förband

Meplex Border PostOp, tacrylvadd, klinglinda, elastalinda.

Smärtlindring

Pain Buster (100 ml, 2 ml/tim) anläggs av operatör och förbereds/fylles av operationssjuksköterska. 100 ml Ropivacain 7,5 mg/ml dras upp till Pain Buster. Patienten drar själv bort sin Pain Buster efter 2 dygn, i övrigt som vid generell anestesi.

Postoperativt - kontroller

- Puls, blodtryck, saturation och andningsfrekvens var 15:e minut i 1 timme, därefter v b
- Tempkontroll direkt vid ankomst postop, ev värmetycke. Därefter temp v b
- Kontroll av förband, förstärkas v b
- Kontroll av färg och temperatur på fingrarna (bandaget kan sitta för hårt)
- Högläge av handen i armskena
- Kontrollera smärta ofta enligt VAS-skalan
- Bladderscan av urinblåsan enligt rutin
- Fika innan hemgång
- Kontroll av Pain Buster

Utskrivning dagkirurgi

- Patienten skrivs ut av den ortoped som har opererat
- Särskilt träningsprogram för opererade radiusfrakturer