

# Återbesök för ryggpatienter från akutmottagningen

Ett vårdprogram/kliniska riktlinjer för ländryggssjukdomar har tagits fram i samarbete med Primärvården.

Se DocPlus: "Ryggsjukdomar-kliniska riktlinjer". Utredningen av patienter med ländryggssymtom och/eller

ischias sker normalt via Primärvården. MRT ländrygg är radiologisk grundutredning och denna skall

normalt initieras via husläkare i enlighet med de kliniska riktlinjerna.

Överväg alltid om återbesök till ortopedmottagningen är nödvändigt och om inte utredning istället kan ske via Primärvården med hänvisning till de kliniska riktlinjerna. I princip bör endast patienter som misstänks ha allvarlig underliggande sjukdom (s.k. röda varningsflaggor) utredas akut/subakut via ortopediklinikens försorg.

Om er bedömning är att patienten ej kan utredas enligt ovan utan att initierandet av snabb poliklinisk utredning är enda alternativet till att lägga in patienten för utredning, kontakta ryggjouren för diskussion!

Patienter med behov av akut utredning och omhändertagande läggs in för detta. Exempel på detta är misstanke om cauda equinasyndrom, progredierande motorisk pares eller total oförmåga att klara sig hemma på grund av smärta. Vid motoriska bortfallssymtom och/eller cauda equinamistanke beställs akut MRT och ryggjouren informeras.

Med beaktande av ovanstående kan vi omhänderta förtursprioriterade patienter så snart som möjligt på ryggsektionens snabbmottagning och undviker att akutmottagningen etableras som en "genväg" till ortopedmottagningen.