

## Smärtlindring för barn vid stiftextraktion/sårkontroll, ortopedkliniken

### MEDICINSK INDIKATION

Barnen som planeras för stift ut/sårkontroll behöver tillräckligt med smärtlindring i samband med ingreppet. Smärtmedicinerna behöver tas i premediceringsdos av barnen en timma inför bokade tiden på mottagning. Således smärtmedicinerna behöver tas hem innan barnet kommer till mottagningen.

### TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

[Information](#) ska skickas hem till patienten i samband med kallelse eller ge patienten direkt i handen när de får tid av tidsbokningen. I patientinformationen är det luckor vid smärtlindrande mediciner (Alvedon+Ipren) som skall fyllas av sjuksköterska på ortopedkliniken enligt följande tabell:

| <b>Paracetamol (Alvedon®) oral lösning 24 mg/ml eller supp 125 mg, 250 mg</b> |  |
|---|--|
| Kroppsvikt (kg)   |  |
| 10–12   | 250 mg = 10 ml eller 2 stycken supp á 125 mg |
| 13–19   | 500 mg = 20 ml eller 2 stycken supp á 250 mg |
| 20–25   | 750 mg = 31 ml eller 3 stycken supp á 250 mg |
| >26   | 1 000 mg = 41 ml                             |
| <b>Paracetamol (Alvedon®) 1 tablett 500 mg</b>                                |  |
| Kroppsvikt (kg)   |  |
| 10–12   | 250 mg = 0,5 tablett                         |
| 13–19   | 500 mg = 1 tablett                           |
| 20–25   | 750 mg = 1,5 tablett                         |
| >26   | 1 000 mg = 2 tabletter                       |

## Smärtlindring för barn vid stiftextraktion/sårkontroll, ortopedkliniken

| <b>Ibuprofen (Ipre<sup>®</sup>) oral lösning 20 mg/ml eller supp 60 mg, 125 mg</b> |   |
|--|---|
| Dosering till friska barn över 6 månader   |   |
| Kroppsvikt (kg)  |   |
| 10–14  | 70 mg = 3,5 ml eller 1 stycken supp á 60 mg                           |
| 15–19  | 100 mg = 5 ml eller 1,5 stycken supp á 60 mg                          |
| 20–30  | 200 mg = 10 ml eller 1 stycken supp á 125 mg + 1 stycken supp á 60 mg |
| 31–45  | 300 mg = 15 ml  |
| 46–64  | 400 mg = 20 ml  |
| 65–80  | 500 mg = 25 ml  |
| 81–90  | 600 mg = 30 ml  |
| <b>Ibuprofen (Ipre<sup>®</sup>) 1 tablett 200 mg</b>                               |   |
| Kroppsvikt (kg)  |   |
| 31–45  | 300 mg = 1,5 tablett  |
| 46–64  | 400 mg = 2 tabletter  |
| 65–80  | 500 mg = 2,5 tabletter  |
| 81–90  | 600 mg = 3 tabletter  |

**Observera att dessa doser är högre än de doser som står på förpackningarna!**