

BAS-test, rutin för

Författat av: Linda Hammarström, Malin Persson

Berett av: Erika Fjordkvist

Beslutat av: Sektionschefer

1 Rutin

Blodgruppering tas rutinmässigt inför alla ortopediska operationer.

BAS-test tas rutinmässigt inför alla ortopediska operationer förutom:

- Höftledsluxation (vid sluten reponering)
- Axelledsluxation (vid sluten reponering)
- Elektiv fotoperation där det inte ska tas crista-ben (undantag fotledsartrodeser och fotledsprotoser som ska ha BAS-test.)
- Fotledsfraktur
- Underarmsfraktur – radius, ulna, hand
- Mikroskopisk diskektomi
- Stabilitetsprovning/mobilisering i narkos
- Sårrevision/undertrycksbehandling
- Sensutur/muskelsutur
- Artroskopier

OBS! Överväg om BAS-test ska tas på ovan angivna operationer vid:

- Blödningsbenägenhet
- Tidigare transfusionsproblem
- Pågående behandling med antikoagulantia
- Ingrepp som inte är av standardkaraktär
- Anemi (Hb <117 g/l kvinna, Hb < 134 g/l man)

För patienter där BAS-test är taget och behöver MG-testas skall 2 E erythrocyter beställas.

Vid osäkerhet – kontakta ansvarig läkare för ordination.