

Extraktion av osteosyntesmaterial barn / ungdomar

Författat av: Peder Weckström

Beslutat av: Evelina Pantzar-Castilla

1 Beskrivning

- Percutana stift lämnade utanför huden extraheras på ortopedmottagningen enligt operatörs instruktion, vanligen 3-4 veckor postoperativt.
- Stift avklippta under hud extraheras i sövt tillstånd på operation enligt operatörs instruktion. Äldre barn/ ungdomar: I lämpliga fall kan man överväga extraktion i LA.
- Stift/ skruvar/ plattor som sitter över eller igenom fys extraheras snarast frakturen bedöms läkt.
- Plattor, skruvar, spikar kring höftled/ proximala femur bör tas bort, vanligen ca.1 år postoperativt eller vid fyseolys när fyserna är slutna
- TEN-spikar lårben och underben extraheras när frakturen är läkt, vanligen 6-9 månader postoperativt. Extraktion < 6 månader postoperativt endast i undantagsfall.
- TEN-spikar underarmar: Grundregel är att de lämnas kvar. Detta innebär att de vid operation lämnas korta, utanpå cortex, ej bockas upp. OBS att de inte ska slås in i mörghålan vid operation.
- Plattor/ skruvar underarm som ej låser fys kvarlämnas.
- Övriga plattor och skruvar: Individuellt ställningstagande.
- Ungdomar med slutna fyser: V.g. se riktlinjer för vuxna.