

KAD

Författat av: Erika Evald

Berett av: Anders Lundin, Johan Edfeldt, Viktor Hiding

Uppdaterat av: Malin Hydén och Jennifer Lehto

Beslutat av: Bjarne Lund Pedersen, Erika Evald

1 Ansvar

Insättande av KAD är en läkarordination.

Vissa patientgrupper skall rutinmässigt erhålla urinkateter och beslut får då fattas av ansvarig sjuksköterska.

2 Rutin, sjuksköterskans ansvar

Följande patientgrupper skall rutinmässigt ha KAD vid operation, beslut om KAD-sättning fattas av sjuksköterska:

- Alla patienter, oavsett ingrepp, med operationstid >2 timmar. Se i Provisio för uppgift om planerad op-tid. Vid ingrepp med operationstid >3timmar ska Temp-KAD sättas.
- Nackoperationer
- Fusioner
- Höftplastiker (OBS! Sätts ut samma dag)
- Axelrevisioner, höftrevisioner, knärevisioner
- Bäckeneosteotomier (PAO)
- Calcaneus-, Talus-, LisFrancskador som kräver OP
- Vid epiduralanestesi (t.ex. amputationer)
- Vid residualurin >200 ml preop – kontakta anestesin

Vid insättandet av urinkateter skall alltid hänsyn tas till patienten och dess unika behov/möjligheter. Andra orsaker till att patienten kan behöva KAD kan vara svår smärta, placering i sträck eller förväntad lång tid till op, ex. vid antikoagulantibehandling. Vid osäkerhet på korrekt indikation för KAD-sättning kontaktas ansvarig läkare.

Hantering och märkning: Kateterpåsen märks med datum. Påsen byts enligt rutin 1 gång per vecka. Påsen kan behöva bytas oftare vid exempelvis blod eller grumlighet i urinen.

Kontraindikationer för KAD-sättning: Bäckensfraktur med risk för skada på urinröret, urinförträngningar som ej kan passeras med en urinkateter, nyligen opererad i urinrör, urinblåsa eller prostata.

3 Utsättande av KAD

KAD skall rutinmässigt dras dag 1 postoperativt om inga medicinska skäl föreligger som hinder.

Observera att KAD skall dras redan på OP-dagen för höftplastikpatienter!

KAD dras kl. 06:00. Uppföljning av blåsfunktion enligt PM

Vårdrutin med dokumentation gällande blåsövervakning av urinblåsan, vuxna. Patienter där avveckling av KAD misslyckats kan patienten gå hem med KAD och skall då remitteras till primärvården för avveckling inom 7-14 dagar (läkare ordinerar tiden).