

Doknr. i Barium 24213	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2019-12-10	Version 4
RUTIN Generell ordinationsmall för läkemedel inom verksamhet Ortopedi. ORT			
Innehållsansvarig: Lisa Johansson, Överläkare, Läkare ortopedi (lisst6); Susanne Söderbergh, Sjuksköterska, Avdelning 233 (susso3) Godkänd av: Anna Nilsdotter, Verksamhetschef, Verksamhetsgemensamt (annni155) Denna rutin gäller för: Verksamhet Ortopedi			

Revideringar i denna version

Det är tillagt en kontraindikation att gravida i första trimestern inte skall ordinerats Ondansetron (Zofran) mot illamående p.g.a. risk för missbildningar enligt riktlinjer från Läkemedelsverket.

Syfte

Öka patientsäkerheten inom ortopedin gällande läkemedelshanteringen.

Vilka berörs

Samtliga sjuksköterskor på vårdavdelningarna och ortopedmottagningarna inom vuxenortopedin.

Arbetsbeskrivning

Enligt SOSFS 2000:1 får läkemedel utdelas av sjuksköterska enligt skriftliga generella direktiv. Ordinationer enligt generella direktiv ska utfärdas restriktivt och omprövas regelbundet. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Given dos skall registreras med signum av sjuksköterska i läkemedelslistan. Allmän kontraindikation är överkänslighet mot läkemedlet eller någon av de ingående komponenterna. Läkemedel med samma effekt eller likartade ingående substanser får inte ges samtidigt utan speciell läkarordination. Beakta behov av dosreduktion vid hög ålder och/eller nedsatt allmäntillstånd. Läkemedel enligt generella direktiv finns förutom på denna lista i Melior/läkemedelsmodulen.

RUTIN

Generell ordinationsmall för läkemedel inom verksamhet Ortopedi. ORT

Läkemedel	Dos vuxen	Gångar	Maxdos/ dygn	Adminstrationssätt	Kontraindikationer/ kommentarer
-----------	--------------	--------	-----------------	--------------------	------------------------------------

Tillfälligt illamående

Tablett Postafen 25 mg	1 st	1	1 st	po	Nedsatt leverfunktion, se FASS
Tablett Primperan 10 mg	1 st	3	3 st	po	Vid nedsatt lever och njurfunktion bör dosreduktion övervägas Innehåller Laktos se FASS
Tablett/Munlöslig Zofran 4 mg	1-2 st	1	2 st	po	Gravida i första trimestern
Inj Ondansetron 2mg/ml	2 ml	1	2 ml	intravenöst	Gravida i första trimestern Långsamt intravenöst

Syrgas/Medicinsk oxygen, komprimerad 100%	1-2 liter	-	1-2 l/dygn	grimma	KOL, astma och annan obstruktiv lungsjukdom
---	-----------	---	------------	--------	---

Smärta

Tablett Alvedon 500 mg	1-2 st	4	8 st	po	Gravt nedsatt leverfunktion, annat läkemedel med paracetamol, gallbesvär
Supp Alvedon	1-2 st	4	8 st	rektalt	
Brustabl Alvedon 500 mg	1-2 st	4	8 st	po	
Tablett Ibumetin 400 mg	1 st	1	1 st	po	Aktivt magsår Gravt nedsatt leverfunktion Svår hjärtsvikt Svår njursjukdom Tredje trimester av graviditet

RUTIN

Generell ordinationsmall för läkemedel inom verksamhet Ortopedi. ORT

Läkemedel	Dos vuxen	Gånger	Maxdos /dygn	Adminstrationssätt	Kontraindikationer/ kommentarer
Kapsel OxyNorm 5 mg	1 st	3	15 mg	po	Nyblivna mammor Andningsdepression Sänkt medvetande Allvarlig KOL Cor pulmonale Allvarlig bronkialastma Paralytisk ileus
OxyNorm Oral lösning 1 mg/ml	1-5 mg	3	15 mg	po	Nyblivna mammor Andningsdepression Sänkt medvetande Allvarlig KOL Cor pulmonale Allvarlig bronkialastma Paralytisk ileus
Inj vätska OxyNorm 10 mg/ml *se nedan	1-5 mg	var 4:e timma	10 mg	intravenöst inj vätska 10 mg/ml spädes till konc.1mg/ml; 1ml av lösning 10mg/ml + 9 ml NaCl	Långsamt intravenöst Nyblivna mammor Andningsdepression Sänkt medvetande Allvarlig KOL Cor pulmonale Allvarlig bronkialastma Paralytisk ileus
Inj vätska OxyNorm 10 mg/ml *se nedan	1-5 mg	var 4:e timma	10 mg	sc	Nyblivna mammor Andningsdepression Sänkt medvetande Allvarlig KOL Cor pulmonale Allvarlig bronkialastma Paralytisk ileus

* Om Oxycontin ordinerats kan denna bytas mot Targiniq i samma dos, till patienter som tidigare besvärats av obstipation i samband med opioidbehandling.

Sömnsvårigheter

Tabl Zopiklon/Imovane 5 mg	1-1,5 st	1	1,5 st	po	Myastenia gravis Sömnapné Svår leverinsuff Svår resp insuff
-------------------------------	-------------	---	--------	----	--

RUTINGenerell ordinationsmall för läkemedel inom verksamhet
Ortopedi. ORT

Läkemedel	Dos vuxen	Gångar	Maxdos/ dygn	Adminstrationssätt	Kontraindikationer/ kommentarer
-----------	--------------	--------	-----------------	--------------------	------------------------------------

Oro och ångest

Tabl Stesolid 5 mg	1 st	2	2 st	po	Myastenia gravis Sömnapné Svår leverinsuff Svår respiratorisk insufficiens
Tabl Oxascand 5 mg	1 st	2	2 st	po	Sömnapné
Oral lösning Heminevrin 50 mg/ml.	6 ml	2	12 ml	po	Akut resp insuff, sömnapné. Obs! Risk för blodtrycksfall.
Kapsel Heminevrin mjuk 300 mg.	1 st	2	2	po	

Obstipation

Dospulver Movicol	1 st	3	3 st	po	Akuta bukbesvär, inflammatorisk tarmsjukdom
Oral lösning Laktulos 670 mg/ml	30 ml	1	30 ml	po	Akuta bukbesvär, galaktosemi, laktulosintolerans.
Orala droppar lösning Cilaxoral 7,5 mg/ml.	5-10 drp	1	10 drp	po på kvällen	Akuta bukbesvär, svår dehydrering
Rektal lösning Microlax	1 st	2	2 st	rektalt	Akuta bukbesvär
Klyx rektallösn 1 mg/ml + 250 mg/ml	120 ml	2	240 ml	rektalt	Akuta bukbesvär
Dulcolax supp 10 mg	1 st	1	1 st	rektalt	Akuta bukbesvär

RUTINGenerell ordinationsmall för läkemedel inom verksamhet
Ortopedi. ORT

Läkemedel	Dos vuxen	Gångar	Maxdos/ dygn	Adminstrationssätt	Kontraindikationer/ kommentarer
-----------	--------------	--------	-----------------	--------------------	------------------------------------

Halsbränna

Tugtablett Novalucid	1 st	4	4 st	po	Grav njursvikt
Enterokapsel Omeprazol 20 mg	1 st	1	1 st	po	

Slemlösande

Brustablett Acetylcystein 200 mg	1 st	3	3 st	po	
-------------------------------------	------	---	------	----	--

Allergi/Klåda/Svamp

Tablett Desloratadin 5 mg	1 st	1	1 st	po	
Tablett Tavegyl 1 mg	1 st	3	3 st	po	Vattenkastnings- svårigheter, försiktighet vid myastenia gravis, se FASS
Kräm Pevaryl 1 %	1 dos	1-2	2 ggr	utvärtes	

Tromboflebit vid infart

Kräm Hirudoid	3–5cm	3	15 cm	utvärtes	
---------------	-------	---	-------	----------	--

Rökabstinens

Depotplåster: Nikotinell 7 mg/24 tim	1 st	1	1	utvärtes	Akut hjärtinfarkt och instabil kärlkramp.
Nikotinell 14 mg/24 tim (< 20 cigaretter/dag).	1 st	1	1	utvärtes	
Nikotinell 21 mg/24 tim (> 20 cigaretter/dag)	1 st	1	1	utvärtes	

RUTINGenerell ordinationsmall för läkemedel inom verksamhet
Ortopedi. ORT

Läkemedel	Dos vuxen	Gångar	Maxdos/ dygn	Administrationssätt	Kontraindikationer/ kommentarer
-----------	--------------	--------	-----------------	---------------------	------------------------------------

Kramper vid EP

Rektal lösning Stesolid 5 mg	1 st	1	1 st	rektalt	
Inj Stesolid 5 mg/ml	1–2 ml	1	2 ml	intravenöst	

Preoperativ svält

Infusionsvätska Glukos 25 mg/ml buffrad	1000 ml	1	1000 ml	intravenöst	Elstatus före infusion
Infusionsvätska Glukos 50 mg/ml	1000 ml	1	1000 ml	intravenöst	
Infusionsvätska Glukos 50 mg/ml med Na40+K20	1000 ml	1	1000 ml	intravenöst	Elstatus före infusion
Infusionsvätska Ringer – Acetat	1000 ml	2	2000 ml	intravenöst	

Obstruktivitet

Combivent lösning för inhalation.	2,5 ml	2	5 ml	po i inhalation	Hypertrofisk obstruktiv cardio- myopati, takyarytmi, överkänslighet mot Atropin.
--------------------------------------	--------	---	------	-----------------	---

Doknr. i Barium 24213	Giltigt fr.o.m 2019-12-10	Version 4
--------------------------	------------------------------	--------------

RUTIN

Generell ordinationsmall för läkemedel inom verksamhet Ortopedi. ORT

Läkemedel	Dos vuxen	Gånger	Maxdos/ dygn	Adminstrationssätt	Kontraindikationer/ kommentarer
-----------	--------------	--------	-----------------	--------------------	------------------------------------

Kärlkramp

Sublingualspray Nitrolingual 0,4 mg/dos	1 puff	1-2	2 puffar		Hjärnblödning/skall skada Läkemedel mot erektil dysfunktion Om kardiell anamnes saknas alltid kontakt akut med läkare Ger snabbt blodtrycksfall
--	--------	-----	----------	--	--

Ansvar

Läkemedelsansvarig läkare och vårdenhetschef på enheten är ansvariga för att rutinen är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska rapporteras i MedControlPro.

Ansvar för utvärdering och revidering har läkemedelsansvarig tillsammans med verksamhetschef.

Dokumentation

Styrande dokumentation arkiveras i Barium.

Granskare/arbetsgrupp

Lisa Johansson, överläkare, Ortopedi Mölndal.

Susanne Söderbergh, sjuksköterska, Ortopedi Mölndal.