

Armbåge, artroskopi i bukläge - dagkirurgi

Dokument-id i Barium
24069

Dokumentserie
skas/med

Giltigt t.o.m.
2023-12-06

Version
6

Innehållsansvarig: Lena Wallström, Anestesisjuksköt., Anestesi Falköping (lenwa6); Charlotta Fallgren, Operationssjuksköt., Operation Falköping (chafa7)

Granskad av: Åsa Appelqvist, Enhetschef, Ledningsgrupp K6 (asaap)

Godkänd av: Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)

verksamhetschef

Publicerad för: K6 Anestesi Operation Intensivvård

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå artroskopi av armbåge i bukläge.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål:

- att patienten är välinformerad och lugn
- att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
- att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
- att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
- att patienten inte får postoperativ sårinfektion
- att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.

Speciell omvårdnad: Vårdhandboken

- Gyntopp
- Vinkla de övre benplattorna lite nedåt och de nedre benplattorna lite uppåt, så att patienten vilar med böjda höftleder och knäleder
- Patienten sövs på rullvagn, vänds till bukläge vid överflyttning till operationstoppen
- Två armstöd, på operationssidan vinklas armstödet nedåt utmed operationstoppen underarm och hand ska hänga fritt ut över armbordet, på andra sidan vinklas armstödet uppåt med kudde under armhålan
- Knäkudde under vristerna, inget tryck mot tårna
- Benremmar över underbenen
- Manschett för blodtomhet placeras högt upp på överarmen - **Styrdokument:** [Blodtomt fält - operationer](#)
- Kontrollera att genitalia och bröst inte utsätts för tryck
- Hårvorka vid behov
- Eventuellt narkosbåge
- Artroskopistapeln placeras mitt emot operatören
- Hink för spolvätska

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.

Speciell omvårdnad:

- Anestesi enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) – TCI - Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping](#)
- PVK motsatt operationssida
- Blodtrycksmätning motsatt operationssida - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Saturationsmätning motsatt operationssida eller öronprobe
- EKG-elektroder placeras på ryggen
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Ögonförband eller tejp över ögonlocken
- Ansiktskudde placeras på huvudplattan i stället för madrassdel och kudde
- Tubförlängare kopplas
- Kuffslang fästs längsmed tuben
- Kontrollera i ansiktskuddens spegel att patienten ligger bra efter vändning till bukläge
- Varma täcken
- Vid förväntad lång operationstid engångs värmetycke + temperaturmätare
- Hörselproppar

Nutrition: Risk för aspiration, PONV.

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.

Speciell omvårdnad: - **PM:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping bladderscan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Ljusledaren utgör en brandfara
- Mobilisering och massage av patientens armar och ben varannan timma

Avveckling

- Patienten vänds till ryggläge vid överflyttning till rullvagn och väcks
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesis disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet