

## Axel, artroskopi, akromioplastik halvsittande - dagkirurgi

Dokument-id i Barium  
24074

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2023-12-06

Version  
6

**Innehållsansvarig:** Lena Wallström, Anestesisjuksköt, Anestesi Falköping (lenwa6); Charlotta Fallgren, Operationssjuksköt., Operation Falköping (chafa7)

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, Enhetschef, Ledningsgrupp K6 (asaap)

**Godkänd av:** Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)

verksamhetschef

**Publicerad för:** K6 Anestesi Operation Intensivvård

### Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Förändringar under hud/vävnad

Förändringar under andning/cirkulation

### Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå artroskopi av axel, akromioplastik halvsittande.

### Arbetsbeskrivning

#### Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

**Mål:**

- att patienten är välinformerad och lugn
- att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
- att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
- att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
- att patienten inte får postoperativ sårinfektion
- att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

**Plocklista,** se lokala för SkaS Falköping.

#### Uppläggning

**Hud/vävnad:** Risk för tryckskador, nervskador.

Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)

- Axeltopp
- Ställ in operationstoppen med 60° lutning av ryggstödet, stor grön/svart knäudde
- Armstöden fästs i höjd med patientens lår och vänds uppåt
- Huvudstödet ställs in innan patienten sövs
- Benremmar fästs över låren
- Eventuellt enligt operatörens önskemål: Droppställning specialanpassad och 3 kilos vikt placeras i en klova på operationssidan i höjd med patientens fötter. Armsträcket anläggs från handen till ovanför armbågen med Actimove sling. Tejpa 3/4 varv med Microfoamtejp ovanför armbågen. Elastisk binda och lina. Kontrollera att handen ligger fri i sträcket.  
Luta droppställningen cirka 75 grader mot fotändan. Linorna sträcks över droppställningen och vikterna hängs på efter sterildrapering, vikterna ska hänga fritt från golvet.
- Före narkosinledning tippas operationstoppen bakåt till liggande ställning
- Huvudhållaren i skumplast sätts på enligt beskrivning
- Justera eventuellt patientens huvud så att det INTE ligger för mycket bakåtlutat och att det inte lutar snett så att halsmuskulaturen översträcks.

Dokument-id i Barium  
24074

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2023-12-06

Version  
6

- Ryggplattan på operationssidan tas bort och remmen spänns diagonalt över patientens bröstorg, från operationssidan till pinnen på motsatt sida. Pinnen fästs med klove i knähöjd.
- Om den sterila armhållaren ska användas monteras den på efter sterildraperingen
- Eventuell VAPR-apparat
- Håravkorta
- Sugan placerad vid fotändan
- Artroskopistapeln placeras mitt emot operatören snett nedifrån
- Hinkar för spolvätska, en under patienten vid huvudändan, en vid artroskopistapeln
- Värmefilt

### Anestesi

**Andning/cirkulation:** Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.

Speciell omvårdnad:

- Intubationsanestesi enligt ordination. Supraskapulär blockad - **Styrdokument:** [Propofol-Ramifentanil \(Ultiva\) - TCI - Lokal tilläggshanvisning SkaS Falköping](#)
- PVK motsatt operationssida
- EKG – tänk på placering så att de inte är i operationsområde
- Saturationsmätning hand/öronprobe motsatt operationssida - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Blodtrycksmätning motsatt operationssida
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Ögonförband eller tejp över ögonlocken
- Engångs värmefilt
- Hörselpropp
- Temperaturmätning
- Enligt ordination: trombosprofylax, kompressionsstrumpor, antibiotika
- Invos övervak
- Styrdokument: [Noradrenalin – perifert vid operation och postoperativ vård](#)

**Nutrition:** Risk för aspiration, PONV.

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

**Elimination:** Risk för överfylld urinblåsa.

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping bladderscan, KAD**

**Att tänka på:**

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Ljusledaren utgör en brandfara
- Kontrollera huvudets läge under operationen
- Mobilisering och massage av patientens armar och ben varje timma
- Om ryggplattan ska sänkas MÅSTE remmen över bröstkorgen lossas
- VIKTIGT: Se till att ryggplattan sitter fast på operationsbordet innan upplägningen

**Avveckling:**

Dokument-id i Barium  
24074

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2023-12-06

Version  
6

- Kylförband IceBand monteras på operationssalen
- Armslynga postoperativt enligt ordination
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städrutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesisins diskrum
- Städrutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet