

## Bäcken-, lår-, knä-, underbens- och fotoperation - SVP operation

Dokument-id i Barium  
23836

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2022-10-16

Version  
7

**Innehållsansvarig:** Karin Tieleman, Sektionsledare, Anestesi Skövde (karti1); Jörgen Härdstedt, Sektionsledare, Operation Skövde (jorha)

**Granskad av:** Krister Löfving, Enhetschef, Ledningsgrupp K6 (krilo)

**Godkänd av:** Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)

verksamhetschef

**Publicerad för:** K6 Anestesi Operation Intensivvård

### Revideringar i denna version

Revidering under Andning/Cirkulation och Sömn.

### Bakgrund, syfte och mål

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation av bäcken, lår, knä, underben eller fot. Tillämpas i Skövde.

### Arbetsbeskrivning

#### Andning/Cirkulation

##### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi, regional anestesi

Risk för blodförlust r.t.

##### Omvårdnads mål

Fri luftväg

##### Omvårdnadsåtgärder

[Generell anestesi-larynxmask, SVP](#) alternativt

[Generell anestesi-intubation - SVP](#) alternativt

[Regional anestesi - spinal eller epidural – SVP](#) alternativt

[Regional anestesi - blockad, lokalanestesi - SVP](#)

#### Elimination

##### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skada av urinblåsa r.t. överfylld blåsa

##### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

##### Omvårdnadsåtgärder

###### -speciell omvårdnad

BladderScan se [Blåstappning vid anestesi](#)

KAD vid spinal

#### Hud/Vävnad

Dokument-id i Barium  
23836

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2022-10-16

Version  
7

## Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge
Risk för hypotermi	r.t.	

## Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud  
Ingen nervskada

## Omvårdnadsåtgärder

### -miljö

Plantopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Blodtomt fält se [Blodtomt fält - operationer](#)

Eventuellt C-båge och i så fall från motsatta sidan

Tvåplans-TV vid märgspikning tibia

Patienten långt ner på bordet

Benrem

Benrem över benen eller andra benet

Vid höftosteotomi ska mjukmadrass tas bort + geldyna

Värmare + övervakning av temperatur vid operation över två timmar

Variera blodtryck och POX, två blodtrycksmanschetter

## Sömn

## Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi
--------------------	------	-------------------------

## Omvårdnads mål

God sömn

## Omvårdnadsåtgärder

### -läkemedelshantering

Vid generell anestesi se

Anestesiform: Larynxmask + TCI/TIVA alternativt

Anestesiform: Oral intubation + TCI/TIVA

## Smärta

## Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	ingreppet
------------------------------	------	-----------

## Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

## Omvårdnadsåtgärder

### -läkemedelshantering

NSAID/opiat vid generell anestesi

Spinalanestesi

Blockad

Lokalanestesi läggs av operatör

Dokument-id i Barium  
23836

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2022-10-16

Version  
7

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.  
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturlista

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.  
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013  
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.  
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.  
[Kunskapsunderlag](#)