

Girdlestone, extraktion av LIH-, eller PFNA-spikar - SVP operation

Dokument-id i Barium
23870

Dokumentserie
skas/med

Giltigt t.o.m.
2022-08-06

Version
7

Innehållsansvarig: Karin Tieleman, Sektionsledare, Anestesi Skövde (karti1); Jörgen Härdstedt, Sektionsledare, Operation Skövde (jorha)

Granskad av: Krister Löfving, Enhetschef, Ledningsgrupp K6 (krilo)

Godkänd av: Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)

verksamhetschef

Publicerad för: K6 Anestesi Operation Intensivvård

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Uppdatering under Andning/Cirkulation. Tillägg av Sömn.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med Girdlestone, extraktion av LIH/PFNA-spikar.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. hög regional anestesi

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP](#)

[Generell anestesi med larynxmask - SVP](#)

Elimination

Risk för skada av urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp alternativt ibland vid PFNA används kollumbord. Hör med operatör.

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Sidoläge på vanlig mjuk madrass som flyttats ner på bordet så det blir ren grop för axeln och sidostöd "Maxfix"

Bakre stödet mot sacrum och främre stödet centralt mot spina iliaca

Dokument-id i Barium
23870

Dokumentserie
skas/med

Giltigt t.o.m.
2022-08-06

Version
7

Geldyna mellan benen
Armbordet vinklat mot huvudändan som sätts vid bukstödet
Stor kudde mellan armarna
Efter operation läggs röda mattan bakom patienten, vänd över till rygg och flytta till säng

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Vid generell anestesi

Anestesiform: Larynxmask + TCI/TIVA

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Spinalanestesi

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)