

Höftledsplastik (total, sekundär, halvprotes, protesnära fraktur) - SVP operation

Dokument-id i Barium
23952Dokumentserie
skas/medGiltigt t.o.m.
2022-08-06Version
8**Innehållsansvarig:** Karin Tieleman, Anestesisjuksköt, Anestesi Lidköping (kart1); Jörgen Härdstedt, Sektionsledare, Operation Falköping (jorha)**Granskad av:** Krister Löfving, Överläkare, Läkare K6 (krilo)**Godkänd av:** Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)

verksamhetschef

Publicerad för: K6 Anestesi Operation Intensivvård**Revideringar i denna version**

Förlängd giltighet. Uppdatering Andning/Cirkulation. Tillägg av sömn.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå höftledsplastik (total höftledsplastik, sekundär höftledsplastik, halvprotes, protesnära fraktur).

Arbetsbeskrivning**Andning/Cirkulation****Omvårdnadsdiagnos**

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t.

hög regional anestesi

Risk för hypotermi

r.t.

steriltvättning, hud- och sårexponering

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

Omvårdnadsåtgärder**-speciell omvårdnad**[Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP](#)Vid sekundär höftledsplastik [Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP](#)[Generell anestesi med intubation - SVP](#)

Patienten bedövas på operationsbordet efter överflyttning från säng i Propofolsedering.

Vid sekundär plastik eventuell orange värmemadrass + vätskevärmare.

Styrdokument: [Biomet Ultra-Drive \(ultraljud\) - föreskrifter](#)**Elimination****Omvårdnadsdiagnos**

Risk för skadad urinblåsa

r.t.

överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder**-speciell omvårdnad**

KAD

Hud/Vävnad**Omvårdnadsdiagnos**

Risk för fallskada

r.t.

förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada

r.t.

kroppsläge

Risk för höftluxation

r.t.

vändning

Omvårdnads mål

Dokument-id i Barium
23952Dokumentserie
skas/medGiltigt t.o.m.
2022-08-06Version
8

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada
Ingen höftluxation

Omvårdnadsåtgärder**-miljö****[Bild höftledsplastik](#)**

Personalen bär microfiberklädsel

Stängd sal

Plantopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Sidoläge på vanlig mjuk madrass som flyttats ner på bordet så det blir ren grop för axeln och sidostöd "Maxfix".

Bakre stödet mot sacrum och främre stödet centralt mot spina iliaca

Geldyna mellan benen

Armbordet vinklat mot huvudändan som sätts vid bukstödet

Stor kudde mellan armarna

Efter operation läggs röda mattan bakom patienten, vänd över till rygg och flytta till säng.

Lassekuddar används endast vid akuta operationer. Ej vid planerade.

Sömn**Omvårdnadsdiagnos**

Risk för awareness

r.t.

ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder**-läkemedelshantering**

Vid generell anestesi

Anestesiform: Oral intubation + TCI/TIVA

Smärta**Omvårdnadsdiagnos**

Risk för postoperativ smärta

r.t.

ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder**-läkemedelshantering**

Spinalanestesi

Lokalanestesi läggs av operatören

Dokument-id i Barium
23952

Dokumentserie
skas/med

Giltigt t.o.m.
2022-08-06

Version
8

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)