

Innehållsansvarig: Hans Forsberg, Överläkare, Läkare Ortopedi Lidköping (hanfo3)

Granskad av: Lotta Kettil, Processchef, Läkare Ortopedi Lidköping (lotke)

Godkänd av: Henrik Hjulström, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K4 (henhj3)

Publicerad av: K4 Ortopedi

Revideringar i denna version

Ny rutin

Bakgrund, syfte och mål

Ordination av läkemedel inför en ledplastikoperation skall ske på ett så säkert sätt som möjligt. Dokumentet är en kortfattad sammanfattning av inskrivande läkares ordinationsstöd vid operation av ledplastik. Syftet är att få alla läkemedel korrekt ordinerade med målet att minska läkemedelsorsakade skador/problem.

Arbetsbeskrivning

NSAID skall sättas ut enligt nedan (under och efter op skall pat ha Etoricoxib (=Arcoxia) och inte sina ordinarie NSAID):

12 dygn före operation
5 dygn före operation
4 dygn före operation
2 dygn före operation

**Alganex, Brexidol
Relifex
Naproxen, Naprosyn, Pronaxen, Alpoxen
Voltaren, Diklofenak, Arthrotec, Ipren, Brufen,
Ibuprofen, Orudis, Siduro, Toradol, Tradil**

ASA (smärtlindring) Albyl, Albyl Minor, Aspirin, Bamy, Magnecyl, Treo

Sätts ut 5 dygn före operation

ASA (för hjärtat)

Trombyl, Persantin eller Trombyl + Persantin: behåll under operationen

Klopidogrel (Plavix) singelbehandling: sätt ut Plavix 5 d före op

NOAK vid Normal risk (flimmer, >1 år trombembolisk sjukdom)

Sätts ut 2 d innan op (undantag för Pradaxa vid nedsatt njurfunktion) om njurfunktion är ok

Waran vid Normal risk (flimmer, >1 år trombembolisk sjukdom)

Sätts ut 5 d före op, inget annat skydd behövs inför op

Hög risk NOAK eller Waran (lungemboli, DVT eller flimmer+TIA/stroke, arteriell tromb senaste året samt mekanisk hjärtklaff). Konsult av Medicinbakjour/Kardiolog som ordinerar!

Revisionsprotos ordineras alltid Fragmin (lättare handläggning vid ev reop)

Övriga riskpatienter skall ha Fragmin

Tablettbehandlad diabetiker

Invokana, Jardiance, Metformin, Forxiga, paus 2d före+efter op. Övriga paus endast opdagen

Hypertoni – Hjärtsvikt – Angina - Arytmier

Aprovel, Atacand, Candemox, Candesartan, Captopril, Cozaar, Diovan, Enalapril, Eplerenon, Inspira, Kairasec, Lisinopril, Losartan, Marozid, Renitec, Ramipril, Spironolakton, Triatec, Valsartan med flera.

Sätts ut dagen före op, op-dagen samt dagen efter op. Längre utsättning om njurfunktionen är dålig.

Amlodipin, Adalat, Felodipin, Isoptin, Lercanidipine, Norvasc, Plendil, Verapamil

Sätts ut opdagen

Amilorid, Esidrex, Furix, Furosemid, Hydroklortiazid, Impugan, Lasix retard, Normorix, Salures

Sätts ut opdagen

Atenolol, Bisoprolol, Emconcor, Inderal, Metoprolol, Seloken samt **Alfadil**

Ha kvar under op

Imdur, Ismo, Monoket samt **Digoxin, Lanoxin** och **Multaq, Cordarone**

Ha kvar under op

Antibiotikaprofylax

- Begränsade utslag utan påtaglig klåda: Cloxacillin som vanligt
- Utbredda kliande utslag och/eller angioödem: Cefotaxim 2g vid 0 och 4 timmar
- Anafylaxi med luftvägssymtom och/eller blodtrycksfall/svimning: Klindamycin 600 mg vid 0 och 4 tim