

## Tranexamsyra (Statraxen) vid ledproteskirurgi

**Dokument-id i Barium**  
26515

**Dokumentserie**  
skas/med

**Giltigt t.o.m.**  
2023-07-21

**Version**  
4

**Innehållsansvarig:** Hans Forsberg, Överläkare, Läkare Ortopedi Lidköping (hanfo3)

**Granskad av:** Lotta Kettil, Processchef, Läkare Ortopedi Lidköping (lotke)

**Godkänd av:** Henrik Hjulström, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K4 (henhj3)

verksamhetschef

**Publicerad för:** K4 Ortopedi

### Revideringar i denna version

Förlängd giltighet

### Syfte

I syfte att minska per- och postoperativ blödning skall Statraxen (Tranexamsyra) ges vid artroplastikkirurgi i knä- och höftled.

### Förutsättningar

#### Ansvar

Läkare ordinerar läkemedlet i läkemedelsmodulen i Melior

#### Avgränsningar

Gäller för artroplastikkirurgi i knä- och höftled.  
Kontraindikationer, se FASS

#### Förberedelser

Läkemedlet kan ges intravenöst antingen 1 g långsamt som injektion (under ca 10 min) eller uppblandat med 100 ml Natriumklorid långsamt som infusion (under ca 10-20 min).

### Arbetsbeskrivning

I syfte att minska per- respektive postoperativ blödning skall Statraxen (Tranexamsyra) ges vid artroplastikkirurgi i knä- och höftled.

Patient med känd överkänslighet mot Statraxen samt patienter med gravt nedsatt njurfunktion skall dock inte erhålla preparatet. Se FASS för ev. dosreduktion.

Statraxen 1 g ges långsamt (under ca 10 min) intravenöst.  
Alternativt blandas Statraxen 1 g med 100 ml Natriumklorid och ges långsamt (under ca 10-20 min) som infusion.

Läkemedlet skall ges långsamt för att minska illamåendet.

Dokument-id i Barium  
26515

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2023-07-21

Version  
4

## Vid höftplastikkirurgi (både elektiv och akut) samt vid knäplastikkirurgi i blodigt fält:

- **Dos 1:** Ge 1 g Statraxen ca 10 minuter innan operationen inleds. Hela dosen bör ha administrerats innan operationen påbörjas.
- **Dos 2:** Ge 1 g Statraxen ca 5 timmar efter den första dosen.

## Vid knäplastikkirurgi där blodtomt fält används:

- **Dos 1:** Ge 1 g Statraxen ca 10 minuter innan det blodtomma fältet släpps. Hela dosen bör ha administrerats innan det blodtomma fältet släpps.
- **Dos 2:** Ge 1 g Statraxen ca 5 timmar efter den första dosen.