

Periprostetisk infektion – kontakt med infektionskonsult gällande antibiotikabehandling

Sammanfattning

Klinikinternt (Ortopedkliniken) dokument angående kontakt med infektionskonsult gällande antibiotikabehandling vid periprostetisk infektion.

Bakgrund

Antibiotikabehandling vid periprostetisk infektion innebär långvarig användning av ibland potentiellt toxiska läkemedel där det ofta också finns föreskrivet regelbunden uppföljning med klinisk laboratorieprovtagning. Se rutin [antibiotikaprofylax inför ingrepp](#) För vissa av de aktuella läkemedlen finns också definierade maximala behandlingstider. Infektionsläkare ordinerar som regel dessa läkemedel på förfrågan från behandlande ortoped.

Förutsättningar

För att undvika missförstånd och risk för felbehandlingar enligt ovanstående samt för att säkerställa adekvat dokumentation ska formell remiss användas vid förfrågan gällande antibiotikaordination där kännedom om bakteriell etiologi och resistensmönster finns.

Genomförande

För frågor gällande kortare antibiotikabehandling, t ex val av peroperativ profylax samt initial behandling efter infektionskirurgi där infekterande agens är okänt (före odlingssvar) är telefonkontakt tillräcklig. Behandlande ortoped ska dock dokumentera svaret i journalen. Se rutin [Registrering av postoperativa infektioner](#) för verksamhetens interna kvalitetsförbättring.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Per-Erik Johansson, överläkare, ortopedkliniken, SÄS

Fastställt av

Mattias Ahlinder, MLA, läkarchef, överläkare
ortopedkliniken, SÄS

Nyckelord

Periprostetisk infektion, antibiotikabehandling, antibiotikaordination,
bakteriell etiologi, peroperativ profylax, infektionskirurgi