

Remisshantering och prioritering för Osteoporosmottagning

Förutsättningar

Sjuksköterska på osteoporosmottagning bedömer och prioriterar remisser för mätning av osteoporos enligt kriterier angivna i dokumentet. Om faktorer i remissen framkommer som gör prioritering svårbedömd lämnas remissen vidare till osteoporosansvarig läkare för bedömning.

Mottagningen använder tre tidsintervall vid prioritering: 30 dagar, 90 dagar eller specifik månad.

Patienter kallas genom omvänd tidsbokning förutom vid följande tillfällen:

Genomförande

Underlag för prioritering av inkommen remiss

Kriterier för tid inom 30 dagar

- Nystartad behandling med högdos kortison
 - Eller signifikant ökad dos
- Mätning inför transplantation
- Nyttillkommen kotkompression (senaste 3 månaderna)
- Nystartad behandling med aromatashämmare.

Kriterier för tid inom 90 dagar

- Övriga remisser för 1:a mätning

Kriterier för tid specifik månad

- Patienter som remitteras för uppföljande mätning där rekommendation om tid för ny kallelse finns. Ex. uppföljning efter 1 år.
- Exklusionskriterier
- Bilaterala höftoperationer hos äldre (över 80 år). Detta gör mätning svårvärderad.
- Fraktur relaterad till högenergivåld
- Nedsatt fysisk eller kognitiv funktion som medför att patienten inte har möjlighet att genomföra undersökningen.

RUTIN

Fastställdedatum

2020-12-01

Gäller fr.o.m.

2020-10-22

Gäller inom

Ortopedklinik

Barium-id

48343

Gäller t.o.m.

2022-10-22

Sida

2 (2)

Utgåva

1

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Håkan Sinclair, överläkare, osteoporosmottagning, ortopedkliniken, SÄS

Christina Vadström-Larsen, sjuksköterska, osteoporosmottagning,
ortopedkliniken, SÄS

Johan Leo Bergfors, vårdenhetschef, osteoporosmottagning, ortopedkliniken,
SÄS

Mattias Ahlinder, medicinskt ansvarig läkare (MLA), ortopedkliniken, SÄS

Fastställt av

Marie Melin, tf verksamhetschef, ortopedkliniken, SÄS

Nyckelord

Osteoporos, remiss, kriterier, prioritering, benskörhet